庫全書

子部

飲定四庫全書

赤水元珠卷二十六

詳校官太醫院思糧 孔纸秀 編修臣倉聖脈覆勘 總校官編修臣王照緒 校對官助教臣下惟吉

騰録監生臣茅

琳

欠三日豆 三日 脫肛乃勝胃有積滞以致濕熱之 脱肛門 But the state of the state of 一名の名の一の古いとまれる 赤水元珠 又或倉坐冷地熱為寒凝結為 當從痔而治痔消而肛 明 而下陷者宜大補中 /氣下流為於肛門而 孫一奎 撰

致新湯 肚子一 無為升提從推從補從升皆當者症又有肛上生蟲 熱之所生也 早細蟲不計其數盡叢於囊垢上肛即收入此亦濕 滑石五多黄連異季 木香江檳榔江京三棱縣山查 者予友黄桂拳丈治一人肛出百方不應乃以生猜 一具刮下垢物用紗囊盛之卷於肛上一夜次 治食積勝胃脫肛不時用此消而推之 枳殼 **禿仁**疹 x


金りしたと言

卷二十

とこううこい 漩腸散 治久痢大腸脫出不收 丹石散 黄丹 訶子肉 表石脂 調服 右為末用茶調肛上絹帛揉入若痢久不止米飲 右為細末新汲水調塗日三五次愈 右水煎食前服精甚者遇仙丹下之方見 滑石等 治外痔脫肛如神 龍骨分等 赤水元川

僧譽散 金ダロだる言 勝雪高 蜜陀僧與枯罄受冰片計 冰片 右為末好酒研成膏塗上即愈 石為未敷上先用苦參湯或防風荆芥湯洗 黄連 治脫肛并痔 鉛霜 治翻花等痔熱痛不可恐或已成瘡 大黄 甘草 苦參 芍

赤石脂散 消黄散 こりうんはう 赤石脂 **浦黄五錢熬猪脂** 頭作癢多是有蟲用生艾川棟根煎湯 石為細末敷肛上 右每五七錢加車前五 治寫痢後肛門不收 伏龍肝等 兩全排成膏塗肛上 赤水元珠



らて、1日日 人は一日 孫仲子泰來曰哮之與喘極須分別疑似之間虚實 道塞滞呼吸不畅唉中如水雞之聲故氣高而喘心 繋非細務也夫穿以聲響名喉中痰威膠塞肺竅 熱而煩擾其角損其項不能压體而拾物貼席而伏 枕也原其疾火内鬱外被風寒東其皮膝肺氣為之 死治惟調氣豁痰解表盖痰出而聲自寢也顧喘以 不利皆上壅胸喉斯乃有餘之疾雖多日不食亦不 哮喘辨 赤水元珠

金り口 **哮發之原有三有因驚風之後而得者由治驚不調氣** 氣息言喉中無痰氣促不相接續有虚有實仲景云 汗出如油喘而不休者死故前人治法有補有瀉是 黄杏子草 故痰不盡徹去有感風寒而得者有食醎酸槍喉而 得者然皆不外乎利肺調氣豁痰六字也 明治哮 不可與穿同日而語也 I sime 治傷寒發汗後不可更行桂枝湯

たこり見いまる 蘇合香丸 大效雄硃化痰丸 張虚煩神困 佳 雄黄 汗出而喘無大熱者及下後而喘 **脉黄兰酮杏仁** 右每服三四錢水煎服 硃砂 治哮調氣豁痰極效治舊風後而得者 十五粒尖 蟬 退 治因驚後哮喘逆觸心肺氣急口 赤水元珠 全蝎性殭蠶 石膏丽甘草雨 此時車星 £ 白附

金少した 九寶湯 甘草 桑白皮 綿不已哮喘咳嗽夜不得卧 仕下 右薑三片烏梅一枚水煎服 右為未麵糊為九麻子大每服二十九薄荷茶清 錢輕粉五 麻黄 治大人小兒素有喘急遇寒暄不常發則連 橘紅 官桂分五 大腹皮 表二十六 紫蘇 杏仁

九己丁見二哥 喘之原有六有風寒傷肺而得者有厚味傷脾精痰上 氣歸源者故治法有疎風解表有清火保肺有清中 化痰有利水滲濕有峻補腎元有单補中氣較之於 破體太早腎未完固而洩其真陰以致腎虚不能納 而氣不得下降者有水腫之疾水溢迫肺而喘者有 過傷其脾胃而中氣虚弱者有火逼肺金金為火侮 迫於肺肺氣為之不利而得者有大病後被尅伐太 明治喘 赤水元珠

黄芩牛夏汤 九實湯 桑白皮湯 金只是在人言 牛夏 甘草 車就熟徑即夜行亦無顛躓之慮也矣 **哮大不相侔兹特揭而明之俚認症循方不啻駕輕** 右薑棗水煎服 枳殼 治風寒哮喘咳吸不能伏枕方見 治肺氣有餘火炎痰盛作喘 治寒包熱哮喘咳嗽 酒芩 天寒加桂枝 桔梗 然蘇 麻黄 杏仁

定喘湯 ことうこと **直東二十一次服 直東二新子經杏仁 洒** 桑白皮 石薑水煎服 黄連 治肺氣大虚氣促上喘汗出而息不續命在 治諸端久不愈 半夏 辭子 酒茶等十 杏仁 桑白皮蜂麻黄 貝母 法製

金定四库全書 須更 Ŀij 麥門冬五幾人參美五味子 右水煎服 杏仁 右為末神麵糊九格子大母服二三十九薑是 瓜姜丸 治食積痰喘壅滞不利 半夏 皂角灰 清中化派 ^ 瓜蒌仁 香附子 橘紅 離蔔

火二可利之司 羅 青黛 右水煎服 右為末用瓜蔞 夏難人妻仁 茯苓幾一青皮江五味子紅白木多五桑白皮數炙甘草 青皮的五味子和 山查 依据為九竹歷生薑湯 赤水元珠 足喘除嗽 神妙 海石 一多三麥門冬 蘿蔔了

となしたとう 雙玉九 神秘湯 橘紅 軟石膏 寒水石汁海 幾半夏以根柳河炙甘草! 右等分為細末用甘草煎濃膏為九菜荳大每 白湯或淡薑湯送下一錢 右当三片水煎服 治胃火刑肺氣高而喘每至夏月必一發者 治水氣作喘 桔梗 戴顏多五人參万五味子此桑白皮

欠いうし 上与 湯 葶藶大棗瀉肺湯 治上氣喘急身與面目俱浮鼻< 椒目散 八味丸治下元真氣不足腎虚不能納氣歸原而喘 夢歷少好未節大豪 大根 聲重不聞者臭胸膈脹淌将成肺癰 川椒目沉水者略炒為末每一錢薑湯調下 食後服 右水二盏先煎大聚至一盏去聚入草慈煎、 水泛於肺肺得水而浮故喘不得卧 先服仲景小青龍湯二帖再服此 赤水元珠

金グゼールノー 加減八味九 方大附子童便桂心各五 懷熟地輕山樂 参一錢胡悲肉 右薑一片水煎服 右蜜丸赤荳大每服二三十九白湯下 治喘嗽 治全上即前方去大附子加五味了 治下元不足喘不得卧 山茱萸肉錢二茯苓

欠記切りんはかり 治哮喘欲成龜胸龜背者 一緒湯 杏仁失妙胡雅肉皮 半夏節と炙甘草 嚼再飲止敷化痰 右生薑一片水煎服 右等分研為膏加煉蜜九彈子 胡恋肉三枚薑三片臨卧嚼吃飲湯三四口再 治痰飲喘急不能卧人扶而坐 1 皂角之本 赤水元珠 大臨卧嚼下 服即安 7

有傷風敷有傷乳食嗽有痰嗽有火敷有虚吸風者鼻 かななしんと言 两二 塞或流清涕乳食者胸腹飽悶發熱日輕夜重痰者 甜夢應兩五味子兩紫蘇子兩杏仁五幾桑白皮 咳嗽門 咳便有痰喉中常有痰靡火者發熱面赤小 山人加靈三分神效 右蜜丸黍米大每三五十九淡豆豉湯下 銅壁

こうとここの 聲重鼻塞頭目昏眩痰氣不利 麻黄草蘇子如桑白皮生杏仁 茯苓 陳皮各五 四肢拘倦咳嗽多痰胸滿氣短 酥黄 杏仁皮头甘草 溢虚者呼吸力微大小便利體倦而面色青**白** 右薑葱白煎温服取汗有熱加前胡有痰加半 治感胃風邪鼻塞聲重語音不出頭痛目眩 治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩悶項背拘急 东水元珠

金万旦尼台雪百 金佛草散 金佛草 荆芥四半前胡 涎不利咳嗽喘涕垂稠粘壮熱惡風 右每三錢薑豪煎服嗽甚加杏仁五味子 右每服三五錢水煎服 治傷風頭目昏痛往來寒熱肢疼煩悶痰 夏谷之 治傷乳食停痰咳嗽或吐白沫氣喘 康黄 去節各 甘草或赤

史三四五人二司 問 新傷乳食咳嗽用二陳湯加蘿蔔子杏仁枳殼麥芽 白餅子 滑石 白茯苓 麥芽湯下 右研勻巴豆後入糯米飯搗為九菜荳大揑作 子三歲已上三五餅已下一二餅煎葱湯下傷食 右薑三片煎服 輕粉 治傷乳食停痰咳嗽氣粗喘急及冷痰腹痛 半夏錢半厚朴製五甘草二 牛夏 南星幾一巴豆我水煮 赤水元珠 乾去

くたりしんぐう 貝母 桑白皮髮地骨皮西 右每三錢加粳米煎服 右仝炒去巴豆只用二 治胃火食積痰火面亦氣粗喘嗽亦見 治火刑肺金咳嗽喘急 化痰止嗽下氣進食瀉肺火)類服之食清而敢自止 甘草等

雄黄丸 たいしつらんはり 夏月咳嗽多汗喘咳無力生脉湯佳 久救脚肺之氣不足用前諸劑不效者以六君子湯加 雄黄短半夏 **炎仁桑白皮五味于服之即安** 右末滴水為九菜荳大用米糠拌炒赤色每服七 **九加至十九嘔吐薑湯下痰嗽蘸菜汁下** 治癖精痰嗽嘔吐 二十九白湯下 神妙 赤水元珠 白麵兩 巴霜四十九

金欠口正人言言 咳久連靡不已口鼻出血者茅根湯主之 小兒吐寫不異大人當於大人門擇治故不再論兹採 桅仁 陳皮出牛夏麵 瓜萋根 吐寫門 右水煎臨服加茅根汁一小酒盡全服 以備不時之急但審諦 貝母 知母 石膏 甘草 生地 天門冬 杏仁 桔梗

これり見いいう **凢吐乳直出而不停留者古謂之哯乳但以炒麥芽=** 二香散 [霍亂吐不止者用蘆稷米炒黄煎湯飲之立止 錢橘紅一錢丁香三分水煎服之立止 用白扁苴炒過煎湯與之亦安 百投百效矣 真霍香二钱丁香氨白滑石鈕 白扁直娥苗煎湯飲之立止如無娥苗時月即 止吐如神 T) 赤水元珠 吉

参香散 金ケビアと言言 **凢冷吐者乳不消化多吐而少出面白眼慢神昼額b** 全蝎觀音散 全蝎觀音散 汗出急宜温中理中湯參香散若將傳慢脾者可用 右為末毎三五分米飲調下 右為未每服五七分米飲下 沉香 治寒吐胃虚投諸劑不效者 治吐寫截風定志庶免傳 丁香 藿香 木香多等 變慢生

つこううここ 華香散 香谷等 黄蓍 扁豆 右母三四錢薑棗煎服 石每服三五錢薑豪煎服 白芷 治冷吐瀉臟腑不調瀉下青黄黑白色或如 治脾胃虚吐瀉不進飲食 參銀二木香 全蝎 人参 白术 赤水元珠 羌活 炙甘草 茯苓 炙甘草 防風 蓮肉 天麻蜂二 扁豆

齊生竹茹湯 九熱吐者面赤氣粗唇紅吐出之勢射而遠乳已化色 橘紅 橘紅 黄小水短少二陳湯加薑汁炒黃連黄芩枇杷葉 雞子清或腹疼微熱 右水煎服熱甚者加薑連 右為末每服一錢米飲下 乾葛 藿香 治熱吐口渴煩躁 甘草 枳殼 麥門冬 厚朴製 治瀉棗湯下 竹茄 炙甘草 生薑

益元散 凡食傷而吐者吐出之物有健酸氣眼胞浮面色黄足 次主山車全書 啊 **危冷瀉者面色青白小水清腸鳴漉漉腹中作疼口不** 冷肚熟日輕夜重麥芽枳實青皮槟榔厚朴陳皮之 類消而降之 滑石紙甘草學 右為末薑汁調燈心湯下吐甚者井花水下 治寫之劑 治熱吐面亦氣粗小水短少傷暑作吐尤佳 赤水元珠 ナ

胃苓湯 猪苓 渴益黄散理中 蒼木 六和湯 恐為者面亦唇紅小水短少口 乾六 右薑三片水煎服 澤瀉 治冷寫小水不利 朴鹽汁陳皮 ታታ 桂皮 風犯者藿香正氣散挾具 炙甘草 白术 散燈心湯調

たこりっくいう 明 四苓湯 清六益元湯 凡食傷而寫者腹中或疼或脹嗳氣如敗卯詳 酒連 白术 滑石 炙甘草 白术的赤茯苓 右水煎服 右水煎服 治熱瀉小水短少腹中作疼 治執治 澤瀉 赤水元珠 何小水短少口幹 黄連酒麥芽炒 猪苓 白芍藥物酒苓 ナ

生だした合言 飽硬日數已久而痛在腳腹則宜備急九等下之然 藥為君則效也凡諸内傷初未下膈之時只宜吐之 已下膈入胃則不可吐以香橘餅之類消之若腹中 以麝香肉桂傷魚以橄欖每於理即中倍加所以之 酒麵肉以山查豆腐以蘿蔔子豆粉以杏仁諸東子 以對症之削消而磨之如傷乳食以麥芽糯米食以 如瓜蒂散或蘿蔔子擂滚水取汁多飲之即吐若食 調補寫始止也若補之太早恐食積不消久而變

香橘餅 (17.19 1 11.11) 瓜蒂散 第之宜盲對症之劑之所致也又投已上諸劑不止 為痢疾或為脾洩或為痞滿皆由執衛者失先 瓜蒂松赤小豈氨 者乃蟲寫也當從府治 右為末白湯調下五七分少利用舊納於埃 治食積寫冷寫腹中脹疼 治食傷胸膈脹疼兀兀欲吐煩悶不安 赤水元珠

消積九 保安九 金グロレノニー 香附子的好仁的的白薑沒青皮的陳皮 丁香粒砂仁料二巴豆紅烏梅肉仁 一香 青皮 右為末煉蜜為餅熬蕪湯下米飲亦可 右為末麵糊為丸菜豆大温水送下一二九 不俱 配矣甘草終五 治吐瀉大便酸臭 治傷食寫 陳皮終二厚朴 神勉以麥芽的 京二

くこうこ ここう 六和湯 治吐瀉霍亂 かに 霍者 扁豆以木瓜粉二 能和六腑也 右每三五錢薑棗煎服 半夏 杏仁 暑吐寫以六和湯治之名六和者以且 赤水元珠

金定正二十五三 保安四聖餅 香橘膏 治吐寫 陳皮 砂仁野白荳仁野蓮肉 荆芥湯下 五代赭石城醋洋 地含石城三 右為未蜜九雞頭大每服一九吐用紫蕪湯 白术 厚朴製品麥芽的神動的 3 治吐瀉驚疳吐瀉日久恐傳慢驚 茯苓和一炙甘草 山藥 两各 木香 南星地白附下 青皮奶 錢各

次定四事全書 荳蔻散 治腹痛肠胃虚冷滑洩不禁 睡驚太乙丹 肉荳蔻一枚剜一小孔入乳香一塊濕麵包裹煨熟 扁豆鄉五白芍藥五號 為未每服三五分米飲下 薑湯 右為末端陽日棕搗為餅計重 茯苓 寫米飲 74.0 治寫後糞青鎮點安神止夜啼 桔梗奶一 赤水元珠 驚涛荷 霍者疑川芎 疳米泔水下 一錢毎服 白芷錢 旱

溽者血膜包水癖於脇傍時時作痛也惟癖能發潮熱 盖小兒臟腑不和營衛不暢津液不得流通冷氣搏 者白餅子下之治之不早恐成疳積羸瘦肚脹則難 能生寒熱故瘧家中脫多蓋黄水日久而後成癖此 則結聚而成癖矣進食九消食九可選而用之甚 右為末煉蜜為九櫻桃大良砂麝香為衣每服 九薄荷湯或棗湯化下 夜啼燈心釣藤湯化下

焼丹九 次三日五人方面 甘遂粉光花炒黑五牛粉半辣桂 治也 女精石 輕粉的一粉霜 右為末雅麵糊為在麻子大每服一二九薑家 湯灌下泄後用冷粥補之 **禿仁炒皮豆脂錢二巴霜一般** 治腹脇落結氣滿不得宣通 治乳癖食癖午後寒熱咳嗽肠下結硬 赤水元珠 棚かる五 蓬木 青皮

ノングセン 惡心便利不調乳食減少不消內挾冷痰大便酸臭 或變蒸發熱多日不解因食成顧先寒後熱 裏慢火煨黄色取出去麵將藥再研為細末滴水 盡隔三兩日再 至天明取下惡物如不下漸加九數如好癖太 為九米粒大一歲五九二歲十九夜卧白湯送 右為末入寒食麵一錢水和成餅外再用濕麵包 治嬰兒乳食失節宿食不化胸腹痞滿嘔吐 服以解消盡為度

つくれしりいうこんにいう 七聖九 核去 人赭石縣赤石脂 皮杏仁头皮 為下藥並不虚人 下微利即瘥 右為未証飾丸如泰米大月外兒只服一九米飲 右為末醋糊為九泰米大食遠白湯服日間所 能令黄瘦子頓作化生兒 光花日 料 ~两杏仁、 千金方云此方之妙無所不治雖 赤水元珠 - 炒五十個 青皮 橘紅 皮 巴霜线 主

萬金九 消積九 金なせんと言 檳榔 右為未麵糊為九泰米大食後米飲下 右為末紅棗肉為允萊豈大空心米飲下忌一切 食物盡行消化水無積滞 磨積塊去黄胖神效 消積聚寬腹脹退面腫進飲食化滯物 奏終半黄連炒我大醋級各橘红 加夜明沙鬼十砂醋洋 皂礬紅各等 万般

過癖散 7. 7. a 2. a 2. 海蛤粉 黄丹 硫黄分等 知為度 嚴靈仙為末煉蜜九彈子大紅絹袋威樂 猪肉四兩煮極爛去藥聴喫其積化從大便而下以 血及蕎麥麵 右初伏日修合為細末用好米醋調成膏於新鳥 消一切癖 治癖立效 **本水元末** 丰 九用精

金定匹店全言 錢青萬鄉 **批胡丽黄連** 亦茯苓終赤芍藥 一格肚九 右為未入 取下 盆中晒乾為細末一歲兒服一 一十九人参湯送下 **癃積如藍汁為驗** 人猪肚内蒸極爛同搗為九梧子大每服 治小兒店積發熱 一姓錢 枳實以木香 分空心米飲調 當歸 青皮 五各

導赤散 钦定四季主書 間 車前子散 治小便不利 生乾地黄 木通鄉一黄芩 甘草山鄉 茯苓 猪苓 香薷 車前子 右為末每服五錢燈心湯下 調油髮灰空心灌下 右為末每服一錢井水入燈心煎湯服仍以米飲 右每五錢燈心煎服 治血冰 赤水元珠 参分等 二十四

茯苓散 金砂盐元散 滑石 亦可 右為末每服三錢木通燈心煎湯下或冬瓜 治白尿 炙甘草 海金砂 蓬木版砂仁 治小便淋瀝不通 錢燈心煎湯調下 滑石 甘草分 赤茯苓雨牛 各等 青皮

スシフランショ 淋淋瀝也尿竅澁滯小便點滴而出艱澁而疼頻而數 **皮** 錢各 五 起也由熱結膀胱不能渗洩下焦之氣壅滞而然其 淋門 棱 加棗子 右水煎服痰嗽加製牛夏口腥氣加鹽調理諸痰 逢术 見尿白久而成府此樂實即上 监智仁 赤水元珠 甘草 神妙 麥芽 苴 消食化 陳

金グロじ 熱者大蘆首凡純白濁者厚朴九諸失津液欲成疳 府之候也冷者益黄散主之熱者牛黄九冷而復挾 久變白乃熱疳之邪初出黄白良久變米疳者乃冷 以致清白不分久則成疳而濁也尿初出時微赤良 血淋者熱自小腸而來小腸與心為表裏心主血熱 而小便白濁者茯苓散 则妄行滲於膀胱而致之也 小兒尿出少頃如米泔狀者由乳哺失節傷於脾胃

たいり うべい 正散 滑石 脉赤瘡 山梔子 終五甘草 右水煎服 瞿麥 治小兒諸淋 車前子 治心經為熟口燥咽乾五冰小便遊眼目赤 矣甘草的等 "(稱二錢 木通 木通 赤水元珠 大黄 桑白皮蜜瞿麥 扁並 車前子 支

五林散 血餘散 通散 毒 白或膏或血 正散 右每二三錢加燈心煎服 之生消黄 治血淋 治膀胱有熱水道不通或尿如荳汁或如沙 治上焦熱小便閉煩躁生嗔及淋瀝諸瘡 加赤茯苓 生地黄 黄芩

君朴九 次足四事全書 胃苓丸 益智仁 史君子肉恨厚朴製黃連和一木香口錢 清飲 右燈心水煎服 石為末麵糊九赤荳大米飲下三十九 石煎調髮灰空心服 通心氣補漏精小便餘應赤白濁 治小便如米泔甚效分陰陽退潮熱 治諸府小便白濁久則黃瘦不長肌肉 川革解 石菖蒲 赤水元珠 一方加白芍藥茯苓 烏藥 丰

遺尿者謂小便日夜時出多而不禁尿床者謂夜入床 香湯下 草菓米糊九米飲下 嘔吐薑湯下 泄瀉車前子湯 退黃疸調脾胃 此銅壁山人改湯為九即胃苓湯加 料加菌陳五錢燈心湯下 睡去乃小便出而不知也良由下元不足腎與膀胱 遺尿門尿床 浮腫長流水五加皮燈心湯下 附 白濁鹽湯下 黄疸本方 疝氣菌

大三月豆二十二 孫仲子泰來曰夫謂不禁者乃小便出多不計其遍數 劉守真又謂有熱客於賢部干於足厥陰之經乃赴孔 鬱結極甚而氣血不得宣通則疾痺而神無所用故 為下元大虚之症由陽氣虚億不能沒持此急症也 夜渗入膀胱而旋渦遺失不能收禁也此又不可不 固而溺有統攝則不致遗失也 虚冷所致故古方多用温補下元之劑腎氣實則氣 赤水元珠

故遺失不能沒禁愚謂既鬱結極甚不能宣通則小 族且三人皆乏嗣總由下元虚冷良可徵矣劉守真 則早止也亦有至老而不止者余目擊十數人矣余 精通腎氣固即不為治至其時亦自止若治之早 固其原彼尿床者嬰孩童椎常有之盖男子十六而 便所出者僅點滴而已所出必短澁疼痛色必黄赤 謂有熱客腎部干於厥陰廷孔鬱結極甚不能宣通 不急治則死矣非大温大升大補則莫能濟其虚而 欠已回到人之前 雞 雞胜脛散 骨錢 不約為遺溺不禁由是然之守真之論只可言林乃 安能直遂 右每服三 '疾非遗失日久者可擬余不倭僭為辨 治小兒尿床遗溺不自知覺 鴨火 治遺尿 長清不收不禁哉內經謂膀胱約而為 錢薑棗煎服 赤水元 珐 真桑螵蛸奶 終柱心 芫 龍

破故紙散 益智仁散 金罗正正台灣 益智仁 破故紙炒為末 雞胜脛 右為末每服 石為末男用雌女用雄每服 倍 具雞腸焼 治仝上亦治白濁 白茯苓等 治下元虚冷遗尿 ¬烧牛 存生用 錢空心米飲 猪胞熊 錢白湯調服 をニナ 為末雪糕為九白湯

遗尿方 Children Lindo 神錢各 終予 右為末空心米飲下 右為末各照常製芡實粉為九蓮肉湯送 破故紙 乾山藥 治下元虚憊 益智仁 益智仁 巴戟 赤水元珠 錢 仙茅 烏藥路三白茯苓 或如脂膏 山茱萸肉 쾬

猇 小兒陰腫多由甘肥不節濕熱下流或啼哭怒氣不順 金グした 溪謂脫囊腫大陸下不次以紫蘇並葉為末水調荷 搀乾則香油調敷雖皮潰而核欲墜悉有神功 葉包之又謂 或失坐冷地皆能致之 或為偏陸或水實不通亦能發腫此方主? 外腎光腫門 111111 治怒氣不順啼哭鬱氣結於肝經發為陰 人傳此方用野白紫蘇為末 ニナ بر 濕則乾 腫

壮蠣散 て、 フェーニー 黄谷等 **乖仁微炒桂心** 青木香送下亦可 右為末煉蜜九麻子大每服五九或七九九青皮 蠣嘅為細末以津唾調塗腫處即消 **木香葱白煎湯入鹽少許送下** 黄芩煎服 治小兒外腎腫大莖物光明 赤水元珠 丹溪用木通甘草 下或煎大流氣飲研 女刺牡丹皮 黄連當歸

青木香九 里艺好五 陰腫偏墜 兩 取 将兵柳 **槟榔全前藥為末滴水九菜 豈大每服二** 治小兒卯腫 加地龍末 寛山 青木香 用栗米包外再以濕紙裹煨令焦去 分如外野熱者以雞子 膈腹肠疼痛心下堅痞肠 **能仁研如泥津睡調敷** 補骨脂为 華澄茄 清調敷 梹榔 四各

火己日之人に可聞 白散 防風 五苓散内加防風牡丹皮極效有熱者服三黃丸 白豈啊! 桑白皮 右為末酒調服一 治偏墜 治偏墜 牡丹皮 治膀胱龜熱風濕相承發為陰腫小便不利 二錢立效或白湯入鹽下 赤水元珠 白术 木通 東皮多 五

蟬 シグモルショ 所吹 退散 用蟬退五錢水 三次後服五苓散以燈心湯調服 痢門 石為末每: 汁調亦妙 葱地上 陰囊忽腫或坐地多時感受風濕或為蟲蟻 蚯蚓糞為末煎甘草 一錢薑湯調服 碗煎湯熏洗腫處腫消 表二十六 一汁調敷腫 或 須洗

たいしつら かかり 小兒痢疾外感少而内傷多故曰無積不成痢也但當 時令之氣而來體必發熟用人參敗毒散加陳倉米 審諦新久虚實若新起而腹痛手不可近後重裏急 者急宜下之下後看輕重再為調補禁口者審其從 虚弱者但當補養氣血盖虚回而痢自止也脾胃健 砂益元散用生薑汁調燈心湯送下若痢久而腸胃 有熟毒薰蒸胃口虚而不納榖或乾噦嘔惡者以辰 日夜頻进小水短少稠粘之物若腹若血不計遍數 赤水元珠

香脯 金グロアとうで 参敗毒散 精猪肉薄片 職粉 团 利者當利之清六九佳 飲食進痢自旋止日數雖多而無誤於事也小便不 身作痛嘔城惡心噤口 方見丹毒赤遊加陳皮薑聚 将猪肉於炭火上慢矣旋鋪膩粉令勻成脯每以 治小兒刮腸下痢噤口不食閉口合眼至重危 治四時不正之氣發為寒熱症痢或遍 卷二十六

山樂散 **東里里至書** 百 乾山樂 ıŁ. **蓮肉去殼留心張為末每服半** 胃口有毒食之神效 許與吃如未知吃且放鼻邊自然要吃此 |衝心肺借此以通心氣便覺思食 治禁口痢 一雨半地熟為末白湯調 治禁口痢 3 赤水元珠 錢陳来 一錢服之嘔喘立 不飲調下此是 盂

茅花湯 枳殼寬腸散 甘草錢、枳殼炒 茅花一大把水煎服無花用根代之 鳥梅肉做好白茯苓 煩渴引飲無度 右為末每服 治吐血 治下痢津液少臟腑虚燥煩渴引飲及諸病 順氣治痢 下血鼻衂血痢黑痢 錢空心白湯調下 羧二 兩

たれりになら 血也 濕熱故名清六內用紅麴者以其能消食積而化於 桂府白滑石光两炙甘草而红麴與五 行血則便膿自愈調氣而後重自除此方是也 右滴水為九燈心湯下二三十九 右每三錢薑一片水煎服 治血痢小水短少及洩瀉 治赤白膿血果急後重腹中 赤水元珠 此方專清六腑 弄灰

保和九 タラス しん クラ 山查 五炒 右水煎服小 肉桂四甘草 錢各 錢 樂此當歸美酒連 神動的 治食精痢腹疼了 錢滑石三錢若積滞重而熟威者加上 ,一陳皮 水短少日夜後重者加枳殼 汸 酒苓 知餓用此消之 木香 雜筍子 連 麻売 公黄 翹

地榆散 地榆飲 小香連九 たいりったよう 黄連吴茱萸各一兩大香經河子母美核 地偷家河肉煨甘草谷等 右末仍以神麴糊為九葉直大每服一 右為末每服一 石為末妙糊為九萊苴大每三十九米飲下 治赤痢無糞鮮紅點滴而下 治熱痢腹痛赤白頻併 治裏急後重腹疾赤白痢 一錢米飲調下 赤水元珠 五十六

茯苓白木散 きたした 飲食 炒果菜 果根桂心终十 地榆纸甘草 茯苓與白木 右水煎服 右每三五錢燈心煎服 治寒痢所下清白如魚凍者脾弱不思 訶肉與陳皮二段 **小**通 當歸錢 积殼 枳殼錢 甘草 内

朴附丸 大小りう人にす 甘草 厚朴製大附子也乾薑地陳皮分等 解之 生地黄湯下 右為末栗米糊為九每服五七分或一錢米飲下 右剉以生薑三錢全炒爆乾為末米飲調下 木香鏡黃連好其幾要散好二錢 殭難的 治寒痢滑洩不禁 白鳥梅湯下 赤水元珠 如有熱小柴胡湯 主 赤

胃風湯 養臟湯 アラグモア 台言 肉煨 加大附于三片 後重腹腳污痛脫肛如臟腑滑洩夜起及日久虚寒 虚滿腸鳴疙痛下如豈汁或純瘀血 栗殼塞物人参 石每三五錢水煎服忌酒麵生冷 炙甘草蜂 治冷熱不調下痢赤白或如腹血魚腦裏急 治風冷東虛干於腸胃水殼不化泄瀉腹肠 當歸 木香 *二十六 芍藥等 肉桂 肉果煨白木 訶

スニリランニ 黄熟艾湯 各等 藥相皮丸 白芍藥 右為末滴水丸菉荳大白湯下 右每服三錢入粟米 熟痢諸樂不效者 黄柏两一 治 治積熱下痢赤色及治傷寒四五日 川芎 一切膿血惡痢窘痛 當歸 赤水元珠 錢水煎服 黄連 當歸 枳殼終五 肉桂 三十八

噤口痢 荳蔻散 金グレアノニー 黄連 蓮子亦有理 黄連二味煎 濃服之但得 右為末擦牙關二三次 石每服三錢水煎服 黄連 治嬰孩腸胃脆弱 錢各 石蓮子 おニャナ 即能食 呷 大雞 腹即愈此加 丹溪用

肉荳蔻個 生冷 或白冷熱不調日夜頻併愈而又發神效但是葷腥 う: - ここ: 龍骨白礬漩腸止痢 右為末每服 用以婦其腸令不虚滑直衰温臟之 者名韶粉出定州者名定粉總名光粉其性婦 每服五六十九 胡粉线 錢米飲調下或以薄糊九麻子 議曰胡粉即真鉛粉也出韶州 赤水元朱 龍骨幾 凡虚滑日夜無度者服之 枯礬 藥安和腸 錢-隨

神 大效 至聖十金飲子 金定匹库全書 木香與生黃連短肉荳養生 效雞青九 痛肠肋脹滿受濕虚鳴膿血五色相雜或如竟汁或 時痊愈 者稍乾擘破碾為末白麵糊為九麻子大每三五 右為粗末取雞子青搜和作餅慢火炙黄色變紅 十九米飲下 治嬰孩 此方功在雞子青 治先吐後寫後又變痢臍腹 切痢疾不拘冷熱皆效 個

次に口豆といす 大艾煎丸 黄茂家甘草 文葉性 乾葛粉 訶肉爆黄連分等 柳寒里豆炒 當歸 如瘀血日夜無度食少肌羸 右每三五錢水煎服 右為末煉塞為九雞頭子大每服一 治小兒虚痢大渴不止 陳皮 未水元珠 枳殻が烏梅 胡粉炒海螵蛸 粟殼寒木香 淮棗 白术 龍盛分等 白芍藥 九至二九米 四十

术養麵 白术與肉果桃二木香錢 飫下 題白生 鹽路少許和汁與吃看所入多少仍用 右為末白麵 雞青九調理 治噤口痢 枚先用黄蠟如指大 治休息痢及疳瀉日久不愈 雨水搜作餅切作條子水煮熟用 粒飯不食服此效 塊銚内鎔化

剪紅丸 次三月三十三十一 ,兒瘧痢治同大人惟劑輕小耳當於大人科參治兹 側相葉 但准集数方以備緩急不重論也緣其症不外於 感内傷二者而已外感有六經之形症用和 瘧門 右醋糊九糯米湯下 炒熟空心食之大效 治痢鮮血 槐花 枳殼以荆芥穗分等 未水元 ±

清脚飲 人りなしたつき 其變也易勝言哉大人科第八卷中 發之後乃為截之虚弱者補之然初發二三日之間 則內傷未盡鎔也補之截之是開其邪而塞其去路 週頭疼未徹則表邪未盡解也苟疾不清胸腹不暢 必須導痰運脾和解為主切不可遽投補截設汗 陳湯加健脾消導之劑治之盖無疾不作症也数 南治之内傷有胸腹飽滿畫輕夜重之標準只以 治瘴瘧熱而不寒或熱多寒少膈滿不能食 於

一てスコーニー 養胃湯 黄芩 奏的五陳皮以甘草 寒瘧嘔逆 口苦舌乾煩渇小便黄赤大便不利 右生薑三片水煎服 蒼术 甘草分等 治外感風寒內傷生冷温中快膈山嵐瘴氣 厚朴製白术 厚朴 赤水元珠 草果喂柴胡 藿香 果根去於 置

露星飲 金グロをノー 背葛飲 甘草二分錢 香附子り裁為葉る 黄芩 右薑三片棗 石每三五錢薑葱白煎服 狀胡 治久瘧成務以此截之 治嬰孩來食夾驚傷寒四時瘟疫瘧疾 甘草 白术 一枚烏梅一枚煎服 牛夏她 表ニナ六 橘紅 官桂 檳榔 青皮 各等 葛根錢五 常山次酒 酯炒 りり

鬼 うべいフラーといから 南斗散 白术截瘧飲 哭飲 常山製白芷 **常山製大腹皮** 右乘柳枝各七條水煎臨發空心五更服 右酒煎臨發五更服 右用酒醋水各半碗煎七分露1 截瘧 治痰症 治虚弱久瘧脾虚嘔吐不思飲食不拘 南星等分 白茯苓 生各 赤水元珠 盤甲點甘草 宿臨發五更服之 罕二

棋 金グロルと言 何首鳥力 法 何首烏為末鱉血為九黄苴大辰砂為衣臨發五 寒熱極效 石薑五片水煎臨發日五更服 半一炒半 不拘寒熟症端陽日製)四十九片 用生四用 治久瘧陰虚熱多寒少以此補而截 幾橘紅 粒四 麥芽絲 ル

青黄散 **鱉甲飲子** これノファラームが可 甘草 繁甲點白木 左女右 為衣晒乾貯瓶中封固臨用取 青黛及土雄黄雅過 右薑聚煎服 厚朴 消瘧母如神 治雅久不愈腹左有塊名曰雅母 黄芩 白芍藥多等 赤水元珠 草果 檳榔 芳館 j 橋

金グロアトノニー 銅壁山人治瘧母用月蟾丸 子肉 木杏 粮我太上常甲 乾乾粮史君子 右為末醋糊九陳米飲下 湯調下塊消其八即止屢驗屢效 右等分為極細末每 夜明沙 寒多熱少者俱以平胃散加常山草里 黄芪 枳實 當歸 歲用一分空心及夜淡 綠裝醋版 桔梗 苦楝根皮 各 黄連 訂

外感瘧 此内傷瘧熱多寒少者俱以白虎湯加常山草果截 之寒熟相半者俱以小柴胡湯加常山草果截之

吃泥門

小兒吃泥乃胃中熱丹溪用石膏黄芩陳皮茯苓白木 煎服而愈徐氏用宣治一兒食泥土因睡洩瀉遍身 如疥此脾經內外疳也以六君子湯肥兒九而愈

吃生米門

赤水元珠

土

たこりうくこう

生生子曰小兒耳疾多屬風熱上壅亦有因於 蒼术九 吃生米者此胃中有蟲亦宜健脾清熱肥兒九佳盖吃 金はしたと言 泥吃米皆疳之漸當於疳門尋治大蘆薈九等方酌 而用之母使臨期鞅掌也 蒼木米泔浸一日為末証餅糊為允梧子大每服五 · 九米飲下一日三 耳門 治吃生米 服

湯氏云耳有五般常出黄膿者為停耳出紅膿者為膿 C. C. Dunt Attion 孫孝子朋來曰此五者不可謂全無分別詳其名觀其 膿者為震耳症雖五般病源一也皆由風水入耳而 耳出白膿者為纏耳疳臭者為伍耳耳内虚鳴出青 色其間必有說也愚情剖之停耳者為水濕之氣久 治之仍服化痰退熟等劑即愈也 因有積熱上壅而成若不早治久則成聾宜胭脂膏 具中水濕停久搏於氣血**臨而為熟化為**腹汁 ... 东水元珠 中六

金り口 為氣忤逆於經隊心主臭心氣不得下降腎氣不得 耳者耳內疳臭盖耳為肾之外候小兒賢未充足偶 黄以始為停濕所致故曰停耳眼耳者心主血脉血 靡震動故耳中虚鳴肝之色青故出青膿也此因五 熱化為紅膿心之色赤故曰膿具纏耳者肺主氣肺 之色白肺氣不利纏壅上焦化為白膿故曰纏耳伍 停耳中與氣血搏擊醖為熱腹盖脾主濕又脾之色 |通故醖而為疳臭也震耳者易曰震為雷或為雷 たとう いっこり見しい 清上 蔓削于湯 甘菊 计麻 般病源 臟有所感觸隨臟為名故有此五色之 此五臟之因須推五臟之治庶為治本若謂症雖五 一散 右盖最煎食後服 木通 治上焦風熱耳出膿汁頭面瘡癤 甘草 治内熱耳出膿汁 也則予未敢首肯 麥門冬 桑白皮 赤水元珠 赤茯苓 赤芍薬 蔓荆子谷等 生地黄 /相應也既 四さ 热方門風 前胡

清黃散 當歸龍衛丸 金グゼルノニモ 當歸 麝香石 腁 大便秘小便黄常服宣通血氣調順陰陽 木香二线 干醖久而成 石煉蜜丸小荳大每二十九薑湯送下 龍膽草 治耳出黄腺名曰停耳內有風熱外為 大黄 治 肝膽風熱耳中鳴出青腺名曰震耳 蘆香錢五酒茶 柴胡 青黛各五栀子而膽星 黄栢 酒連

へいう 自という 状者 錢二 防風 屑 黄連 心丹 右為末白湯調 右為末每用 三錢滑石錢,甘草 治耳出紅膿名曰膿耳及舌上 滑石亚线甘 N. 一錢食後服 赤水元珠 展砂雅各薄荷水犀角 一生瘡如楊 卜夜再服 四大

清白散 金りて 交感丹 咳嗽 天花粉 桑白皮多地骨皮多二甘草是貝母等寒水石銀 得宣通遂成擊晴 右為末以蜜水調食後服或白通草煎湯下尤妙 1111111 治肺熱痰火 治耳中府臭名曰伍耳或怒氣上逆上下 酒芩 大門久五 卷二十六 | 壅耳出白腺名曰纏耳無治 黄連錄:桂心錄甘菊 'n 垂錢

龍骨散 禹根九 このうらしい 錢 分 大附子用一枚 禹餘粮服雕淬 右為末以綿裹如負眼核大安耳内日再易 右為末每一錢五分燈心湯調下 不瘥乃有蟲也 治停耳出腹水 治諸膿耳 -海票前去背上 赤水元珠 百草霜 伏龍 四十九

羊角散 滋陰地黄丸 金グセ 枯礬 日全瘳 山年角燒存性為末每吹二三分入内一日二次 熟地黄和白茯苓與山茱萸或甘菊與牡丹皮 右為細末先以棉裹杖子拭去耳中膿再吹 八耳中日再加海螵蛸 たん言 龍骨 治耳内膿汁不乾 治耳虚鳴膿汁不乾腎陰不足 胭脂丕錢 一錢尤妙 麝石

てこり かんい 古方皆屬之於肺謂受邪喘久所致又乳母多食辛熱 然此多成痼疾考之古法惟有百合丹枳般防風九 盖胸膈之上乃肺之分野又肺主皮毛若背受風 胎毒於兒感之於師由師脹大而胸高滿如龜狀 客於脊骨故背髙而倭個又或兒坐太早亦能致之 首鳥黑豆蒸黄有多四 龜胸龜背門 右煉蜜九梧子大每服三五十九 1 赤水元珠 7

枳殼防風九 百合丹 金ケレアとろって 川大黄版 甜草態 枳殼 犑 及矣肺俞膈俞二完而已別無治法 右為末煉蜜丸兼豈大每服五九白湯臨睡服 防風 治胸高脹滿其狀如龜 軟石膏 天門冬 治客風入背如龜高衛 獨活 杏仁 卷二十 前胡 百合 麻黄 木通 當歸 桑白皮

炎法 松蕋丹 これり 日本 とれる 松花 大黄 坐早所致 椎下兩傍各 右為末煉蜜九黍米大每十九米飲下 右麵糊九秦米大米飲下 肺俞完第三椎下兩傍各一寸半 桂枝蜂五 枳殼 治初生不暇護背為客風吹脊入於骨内或 J 防風 赤水元珠 獨活兩 以小兒中指量中節 麻黄 前胡 4 膈俞宂第


龜尿法 金岁世正不言 見好食肥甘生冷傷於胖胃脾胃既傷則不能運化 精微而生濕熱濕熱久則生蟲也發則腹中疼痛上 俞中若龜尿不出用猪毛挿入鼻中其尿即出 取烏龜置於新荷葉上用鏡照之其尿自出鍼點脊 下往來無有休止或亦攻心則合眼啼哭撲手仰身 蟲門 每炎艾炷如小麥粒大各炎三五壯 點背腫鳥處節間 į *二十七

化蟲九 大の可言人は可 濕熱肥甘也不亦明乎予故述此生蟲之源以為今 不食肥甘生冷蟲無從而生也即是觀之蟲之生於 病之所在不早療則腹中子母轉轉相生蟲長 足能殺人觀問歲已前小兒鮮有此苦者良由飲乳 飲食難進不生肌膚或寒或熱沉沉嘿嘿不的知其 之為乳母者姑息之戒 神思問亂嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面色青黄 治蟲咬心痛來去不定不思飲食 赤水无珠 五十二

史君子九 金タヒル 厚朴 五三 鶴 不進飲食漸至羸瘦 分錢 香油二 即從大便而下初服甚效 右為未麵糊九菜豈大三歲者服三十九白湯 虱 梹榔 陳皮 一滴吞下食前服如有小蟲皆化為水大蟲 治小兒五疳脾胃不和心腹脹時或污痛 胡粉 史君子肉湯 各一两甘草 枝各五行 錢小 明礬]][芦 生枯

CULDINE LAND 治久痢 局梅三個乾薑二錢 黄連四川椒 其膈須更復上得食而嘔又煩蛔聞食當自吐及 右為末煉蜜九皂子大三歲已上 右為末用酒浸鳥梅肉一宿蒸飯捣為九麻子大每 治蝈厥當吐今反静而復煩此為臟寒蛔 大附子皮斯桂枝 赤水元珠 黄柏錢 一九米飲 當歸錢 x 四 細

檳柳九 金りせんべき 黄雅史君子肉 檳榔 輕粉抄巴霜 油煎将肉細嚼勿吞下但只引蟲頭向上便將肉 右為未酒煮麵糊為九泰米大五更早用猪肉葱 汁調化蟲散或吞檳榔九至已時取下蟲方進食 九日二次忌生冷 鶴虱 貫衆 川棟子肉 乾漆好性燕夷 木吉 黄丹 雷九 錫灰 雄



金牙巴尼人 或痢或風或雅生疳生蟲二十已下其病為疳二十 有乳母未斷乳時先躭身孕兒飲孕乳久為點病以 辜之類不勝枚舉盖脾胃虚則停積積則生熱或寫 脾胃為重五臟皆受氣於脾胃賴坤元以資生也又 已上其病為痨症雖多種源一而派殊也而治總在 其疳成肉消顱大髮穗腿枯形肖傀儡若憋然也又 五疳言五臟之疳也五疳之外其名甚多如曰疳氣 曰疳虚曰疳熱曰丁奚曰哺露曰腦疳曰脊疳曰無

ここりら こより 楊氏作子曰疳之受病皆虚使然熟者虚中之熟冷者 錢氏仲陽曰小兒初病為肥熟疳熟則涼之久病為冷 虚中之冷積者虚中之積治熱不可安表過凉治冷 氣皆成疳兆楊錢二公治論極正採錄於左以為法 賏 有母體虚弱氣血不足乳汁不充强餵粥飯耗傷 瘦疳冷則温之小兒易虚易實過寒則生冷過温則 不可峻温驟補治積不可用霸峻取 赤水元珠 季五

金万世尼人 术消積等劑頭利之藥也脇腹癖痛亦虚中之積先 營衛調和臟腑充實若或過馬君子未保其往也積 者府之母由積而虚謂之疳極凡有積者無不壮熱 氣隨順樂餌以扶持之病家調節乳食以裡養之使 急以和胃之藥扶虚救裏如白荳蔻蘿蔔子砂仁達 脚冷若積而虚甚則先扶胃使胃氣充實方與微利 生熟峻取則重傷脾胃上醫處其消積和胃滋血調 寒後熱飲水不食或飲水而致喘嗽凢熱疳以胡黄

飲定四車全書 銅壁山人日 凡治疳不必細分五疳但虚則補之熱則 生熟地黄九 清之冷則温之吐則治吐利則治利積則治積蟲則 業切科者則亦當知其所自哉 治蟲不出集聖九一方加減用之憂試屢驗別此方 具鼻生瘡者以蘭香散諸瘡白粉散主之 連九冷疳以木香九冷熱疳以通神九主之疳在外 收聚藥品極為工級誠醫中之王道疳門之火豪也 治肝疳白膜遮睛合面而卧肉色青黄 赤水元珠

五六

地黄丸 また. ヒルショ 五各 分二 錢 生地黄 髮穗筋青腦熱羸瘦 熟地黄色山藥 右每三五錢薑三片黑豆二十粒水煎服 半夏 治腎疳極瘦過身瘡疥發寒熱時頭熱脚冷 熟地黄錢五川芳 天麻 山茱萸多四 甘草 K 當歸 赤茯苓 澤瀉 枳殼以地骨皮 牡丹皮 黄連 杏 白

たこううへにす 茯苓丸 茯神 遠志養乾蟾 麝香許石菖蒲縣 八換肌九 右為末蜜丸梧子大每服十五九白湯下 治全上 个糊九麻子大每一 1 治脾疳肌瘦潮熱盗汗飲食具 琥珀 赤水元珠 黄連 一二十九簿荷湯下 赤茯苓幾一釣藤釣 7

靈胎丸 ころした 一二 陳皮 神神 黄連炒繁甲點內果 河肉母公 麝香五厘麥芽 糟粕飲食不化頭大腹急 白荳蒄 麥芽 五靈脂 右為末麵糊九麻子大米飲下看大小服 右為未米糊丸麻子大米湯下 史君子終二乾蟾椒三 治脾疳食疳 史君子肉母 砂仁 達术學青皮

大三リョー 一丁 清肺湯 黄連肥兒丸 連翹 黄連和無夷 月眼合不開 桑白皮蛋炒紫蘇 二錢 分 右每五錢水煎服 防風 治肺疳咳嗽氣逆多啼壮熱惡寒 治一切疳及疳眼亦腫昏暗雀盲或經 麥芽 神妙終五青皮 桔梗 前胡 赤水元珠 茯苓 黄芩 生地 當歸 甘草 至 史君子肉 麥門冬 各二錢 五分

香蔻丸 金グに近く言 大蘆薈九 治疳殺蟲和胃止瀉 黄連萬財肉果根木香 雷九台鶴風五錢麝香 胡黄連 黄連 白蕪夷 蘆薈 木香 青皮 右為末粟米飯九菉豈大米飲下二三十九 右為末飯九麻子大每二三十九米飲下 右各炒為末猪膽汁丸麻子大每十五九米湯下 治疳瀉 訶肉 がに 茯苓

大三日 日本山田 加味肥兒九 加味胡黄連九 蘆舊發五 青皮以東皮 胡黄連 史君子肉 玆 右為末神妙糊為九葉直大米飲空心下三五上 九小兒無熱去胡黃連泄寫加人參茯苓肉果 治諸府身黄肚急痞堪洩瀉瘦弱 梹榔 治疳疾一切虚痢諸樂無功此方極 赤水元珠 麥芽的神動所各川黃連 三棱 莪术松木香 香附 李九

金万正正之言 胡黄連 麝香か 辰砂 膽袋內以繩扎之更入莨若子二錢微炒黃丹 錢二味研末入前樂和与搗五百杵九菉苴大米 右為末用積猪膽汁二枚取汁和樂令匀却装 飲吞下五七九治一切十二種疳痢無辜疳亦佳 史君子 治無辜諸疳 蘆薈 木香 川黄連 を二十六 服虚熱退二服渇止三服瀉 鉤藤 肉果 龍齒 桂心 茯苓多等

スペンファームルー 木香丸 蟾蜍一 利住 黄連幾木者 厚朴製砂仁 方極驗 取起以布袋威安急流水中一宿取出瓦上焙為末 入麝香一字飯為九麻子大每三五七九米飲下此 右為末粳米飯九麻子大毎服二三十九艾薑湯 一隻打死置桶中取糞虫入桶一日一夜将虫 治府痢冷熱不調五色雜下裏急後重 赤水元珠 夜明沙 訶肉錢 六土

金りてして 五疳良方 十全丹 青皮 黄連 梹椰 米飲下有熟薄荷湯下 右為末猪膽汁浸糕糊九麻子大每服二三十九 燕夷 陳皮 蘆薈錢五木香 史君子 治丁奚哺露 治疳 神妙 我术_機川芎 麥芽 陳皮 五靈脂 乾蟾灰絲 白荳仁 乾蟾

天麻丸 **てこりシーニア** 校麝香沙乾蟾頭袋二 蘆膏錢二龍膽草 青黛 黄連 一兩檳榔之史君子在內東上麝香分存性檳榔之史君子 右為末以猪膽汁二枚入好酒打糊為充芥子大 右為末猪膽汁浸糕丸麻子大每二十九薄荷 米飲下二三十九 治肝疳風疳疳眼 天麻 五靈脂 防風 赤水元珠 與退分去 是嘴全男子 川芎 夜明沙炒 ż

金岁世世人 化蛋丸 地黄清肺飲 當歸 蕪美 桑白皮鱼蝎松蘇 鼻生瘡 右水煎食後服次服化蛋丸 蘆薈 連翹 治肺熱疳蛋蝕為穿孔臭或生瘜肉或 青黛 桔梗 前胡 川芎 天門冬 防風 蝦蟆灰 生地 赤茯苓 甘草蜂 白芷 片芩 胡

たんしりいう! Aidulo 下蟲丸 黄連分等 筆熊洗俟前樂各進數服却用青黛川歸赤小荳 右為末猪膽汁浸糕糊丸麻子大每服二三十 食後卧服以杏仁湯吞下其鼻常用熊膽泡湯 瓜蒂地榆黄連蘆薈各等分雄黄少許為細末吹 牧功 **窕仁**** 治疳蛔諸蟲 皮燕美 好概鄉多 赤水元珠 鶴風戦 至 輕

龍膽丸 金少世后四月 督 龍膽草 錢各 二 錢乾蟾灰錢史君子肉板機白苦楝根皮酒浸買聚 治府勞脊勞加川歸黃連各二錢五分 右為末麵糊丸麻子大每三十九空心清肉汁下 右為末猪膽汁浸糕丸麻子大每二十九簿荷湯 油髮灰絲二青黛 治腦疳熱筋瘡 升麻 苦楝根皮 黄連鈴三 防風 赤茯苓 蘆

鰲血煎 濫甲力 こううこう ニュー 旗夷 史君子一枚 炒乾去菜更只用二連俱為末粟米糊九麻子 右用醬血一盏具來更一两拌二連淹一宿次見 卜食後仍以蘆薈末吹入鼻中 一三十九白湯下 柴胡 治疳勞 治無辜疳腹中毒起四肢瘦削 川芎两一 赤水元珠 人參無胡連 ドー

梅肉丸 金定正尼含言 五疳消食丸 定粉 香汕鲳虎鼠 **然甲點黃連** 府唇爛肚大青筋此藥大能健脚進食華顏色 右煉蜜凡泰米大每二三十九白湯下 右為末蜜丸菉苴大每服五九米湯下日三服 治諸府煩渴飲水不休 龍膽草 治五疳八痢殺腹臟蟲療疳劳及走馬 枳殼 烏梅肉 卷二十六 夜明沙五錢前肉生一枚 黄連等分

7.1.10 bl Air 服香散 麥芽 輕粉 落者 肌肉 'n 米飲下不拘時 右為末栗米糊九如栗米大每服二三十九空心 治小兒走馬疳牙酱漬爛以至崩破出血齒 節雪 史君子 1 黄連 赤水元珠 蜜陀僧五錢 燕夷的陳皮 龍膽草 なあ

金ケロアトイラー 地骨皮散 叉方 傳齒立效散 鴨嘴膽養紅一幾麝香的 生乾地黄題真地骨皮 右研極細末以少許傅牙齒觀上 右為末傳齒及與立效 用蟾酥一字加扇香傳之 治腎疳敏腭牙齒肉腐臭鮮血常出)頻用效亦可服 北細辛錢二五倍子 錢焦

7.1. 3 10 Miles 肥肌九 肉炒神麵 效史君檳柳丸 肉果 右為未雄猪膽汁薄荷汁為丸麻子大每三五十 分精滞不化傳為府候 九米飲下 川芎錢 治 檳榔生宣連 7 切疳氣肌 燕夷炒去麥芽炒木香 麝香字 治嬰孩食肉太豆 未水元珠 胡連 瘦體弱神困之力常服殺蟲 陳皮 損傷脾胃水穀 夜明沙が蘆 青皮 主

通神 金なしたと言 黄連 胡連 香錢二 消疳開胃進食 君子肉一錢大蟾蜍 右為末紅麴糊為九麻子大每服三五十九米飲 F 香附順使後半川棟子內州門芳終五 治冷熱疳 川連錢二木香 煮爛研膏一隻剉水 燕夷物丁香 水! 肉果生

たれつうないは 布袋丸 取交妳一切府毒 平日用加阿魏五錢極效 夜明沙五錢精猪肉三两碎切全入瓶水煮爛與兒 切炒黄色再用黄連一兩二味為細末煮麵糊為丸 食之汁亦飲之取下腹中胎毒次用生薑四兩和皮 黍米大米飲下三五十九 右為末膏和丸麻子大每十五丸米飲下 治諸疳面黄腹大飲食不潤肌膚 赤水无珠 たナド 此方于

如聖九 金ケロアノー 夜明沙 苓 胡連 成膏 隻酒 藥取起懸於風處次日再用 精猪肉二兩全入瓦觀煮極爛聴兒食肉飲汁 右為末証餅為九彈子大每一九以生絹袋威用 治冷熱疳瀉極神效 川連 無夷 蘆白錢石 燕夷 史君子肉 史君子肉和二白术 卷二十六 麝香五蟾蜍 甘草

肉東散 煮肝散 ראו לבונו לובול ופונטו 夜明沙 要肉二枚入青礬如核大火煅存性為末入麝香心 許香油調塗 右為末毎服一錢五七歲二錢用雄猪肝如匙大 右為末以膏和為九麻子大毎服三十九人參湯 治疳眼翳膜羞明不見物 治肉疳而瘡侵入口鼻 蛤粉 榖精草的一 赤水元珠 芝

黛連蘆首九 金ピノロアんノニーモ 胡連 治之 見效 空心食之至夜便能見物如患久不效再製服即 次食之即將肝汁送下三次不拘時如大人雀目 肝熟揚肝將汁傾在碗內将目薰之其肝分作三 塊批開掺藥在內攤勻麻扎定米泔水半碗煮 意智 小兒食甘甜飲食食則生蟲生疳以此 川連り史君子錢和麵明 卷二十六 阿魏

次 已四五十二 銅壁山人黄公集聖九 四味肥兒九 川連 青黛卷 精即府目生雲翳口舌生瘡牙 觀腐爛發熱瘦怯· 身生瘡小便澄白腹大青筋 右為末糊九桐子大每二三十九白湯下 右為末糊九泰米大米飲下 燕夷 治嘔吐不食腹脹成疳作寫不止或食 神妙 赤水元珠 麥芽分 治 切疳症附加減法於後 各等 一切疳候

えをしん 歸 蘆薈 去我术青皮因於熱者加龍膽草二錢去砂仁我术 我术 史君子肉緣二川連 五分去青皮莪术因於積痛者加煨三稜川楝子肉 因於吐瀉下痢者加白术二錢肉果煨訶肉各 屢試屢驗 尚香各二錢去當歸川芳因於雅者加鱉甲酯矣 青皮終十 1:11 五靈脂 夜明沙炒砂仁 因於虚者加人參二錢白木三 川芎 橘紅 乾蟾兵終當 木香 錢 錢

こころうらんはす 去當歸川芎因於渴者加人參白木各二錢去莪去 砂仁 一錢因於蟲者加白燕夷 服米飲送下 予按此方乃十全丹去槟榔白豆 右為細末用雄猪膽汁二個和麵糊為九看大小 十全也兹改集聖者集治疳之聖品也此方不熱 不寒補不致滞消不致耗至穩至安故有屢試屢 .加黄連夜明沙砂仁尤為有理方名十全功浆 赤水元珠 錢五分川棟子肉二錢 なん

金ケセルノー 又猪肝散 極佳 雄猪肝不見水者四兩用竹刀批開將新荷葉晒乾 服至已干時取下惡物從大便而出不動臟腑極佳 為末二錢掺入肝內重湯煮熟以肝與兒食之空心 下之下後再以參苓白木散之類調理 癇 驗之語云 眄 治府積痼而體羸弱不經下者用此補而

大三丁三三八三三 錢仲陽云凡治五廟皆隨臟治之每臟各有一獸之形 生生子曰參前論雖以五獸配屬五臟亦是以意測之 驚跳反折手縱其聲如雞症屬肺也肢體如尸口吐 其聲如年症屬心也目直腹痛其聲如牛症屬即也 証益用五色九治之此治小病者發而重者死病甚 者亦死若反折上寫其聲如犬症属肝也目瞪吐舌 耳觀其並用五色九點治之且謂發重者及病甚者 涎沫其聲如猪症屬腎也 赤水元珠

金少し屋です 熱者以涼藥清其心有痰者可用吐法吐後以東垣 驚不必分五等尋火尋痰分多少而治無有不愈有 古未有五獸之分惟朱丹溪乃曰癇症大率屬痰與 安神九及平肝之藥青黛柴胡川芎之類丹溪此論 皆死再無別治法豈謂一五色九悉能之即抑謂此 亦極當理 病為不治之症殆無可奈何即将為畧之即放之 癇病與急慢多相似而質非癇發時養然小地作聲 卷二十六

スニフラ たいう 騰則無此之類也 或三五日再發或受驚而再發或勞心勞力而再發 脉沉者為陰癇屬然墜伏此內在五臟骨髓故難治 膚故易治若病先身冷目半開不驚與不啼叶而作 後即止癇發或一年一度或一季一度或一月一 癇有陰陽若病初作時先身熱開目與遊驚啼叫喊 作播或目上視醒吐涎沫急慢症則不然也盖驚發 而後發脉浮者為陽癇仆地多仰内在六腑外在皮 V 赤水元珠 セナ 一度

金女巴尼台電 戴原禮曰癇有五無非疾涎壅塞迷問孔竅發則頭 變而為陰非順本有陰寒症也 也亦本於疾熱醫以寒涼藥攻下太過損傷脾胃乃 頃乃甦宜星香散加全蝎 聞大驚而作若熱威雖不聞驚亦自作也陰痼其始 孫李子朋來曰凡治驚風顛癇之症而辰砂雄黄金 旋顛倒手足搐搦口眼相引胸背僵直叶吼吐沫食 夫陽癇不因吐下由其內有痰熟客於心胸之間因 基二十六

たいりえんいう 箔水銀鉛粉等劑不可以久服也緣此皆治有餘之 者一身之主神明出馬智慧之所由生也鎮心之劑 消痰之劑則風自定故不專以鎮心攻痰為主且心 臟腑脆弱易致虚耳前劑皆傷脾者丹溪云氣虚之 多惟健脾胃以全運化之職則新痰不生無佐之以 削為之先鋒不可以祛去也稍久則不宜用盖小兒 在舊播初發胃氣尚壮痰邪方威非有慓悍疎利之 人有痰胃氣亦賴所養卒不可便攻攻盡反易生而 赤水元珠 *

金发工厂二十二 呆愚鈍寡言寡笑靈覺寂無愀然可憫 起前樂之 官危余往往見多服驚風鎮心之藥者驚定之後痴 後宜以下精藥看輕重下之積去則不復發 過多則神志奪而聪明室塞內經曰主不明則十 外症嗳吐酸氣或大便雙臭治法先當吐其食俟定 所誤哉幻幻之心當知所慎 又有食癇原從飲食過傷而得後復傷飲食則發其 又名五廟力 巻二十六

これり目 かう 麝香 膽星 黄九 潮屈指如筭數 砂链雄黄 薄荷湯下 分攬硬研末和勻煉蜜為九麻子大母服三四九 右各為細末再以鉛二兩入鉳鎔化投汞二錢五 治風癇因汗出解脫風邪乘虚迷悶搐 殭難 战五分 全蝎岩蟬 退終牛防風 赤水元珠 白附子

比金九 消風九 膽星 川芎 右為末蜜九梧子大每二 右為末棗肉為九水銀五分研細入藥九如菉苣 大每服二九荆芥生薑湯下 羌活 細辛錢 治風癎先宜用此 琥珀 治驚癇先宜用此 獨活 茯苓 防風 遠志法心 藍珠砂 天麻 人系统 护

金牙口匠会言

化風丹 ころうえ 荆芥 膽星 石菖蒲 聖力 精石版 右為未蜜九皂角子大每 石為末蜜九梧子大每二九簿荷湯下 羌活 1.1.1 粉草鈴 涼風化痰退熱定搐 治食癎因驚而傷食吐乳發熱大便酸臭 錢半巴霜錢雄黃 川芎 獨活 南星 全蝎 赤水元珠 防風 枚 青黛翁 天府 全蝎 九簿荷湯化下 麝香 參 とナロ 川芎 輕

鲻 金ケヒたる言 牛黄线 澗丹 麝香等 神湯 黄茂雞到藤 右為末聚肉為凡麻子大人參湯下每服十數九 右為末棗肉為九梧子大每一二九木賊湯下 看兒大小 治癇蹇後復發症候多端連綿不止 治膽氣虚寒頭疼目眩心神恐懼不能獨處 杏仁线二 細辛 甘草五錢蛇退二寸與退回

養心湯 ライス・フ・ス・ ハ・・・ 桂 熱煩躁 右每五錢水煎服 相子仁 桂心 治心血虚怯驚癎或聲 酸聚仁的黄茂 酸棗仁 熟地 茯神 赤水元珠 五味子 參 炙甘草級五 栢子仁 當歸 白芍 ナナ五 官

金好口库全書 妙香散 五癇九得效方 草五分錢 志 汗等症 展砂與麝香與木香與二茯苓 右為末每服 右薑水煎服 黄茂以於枯梗 治心氣不足驚癇或精神恍惚虚煩少寐盗 錢温酒或白湯下 炙甘草 山樂 参錢五 茯神 逺

欠九丁巨人山 銅壁山人治諸癇發歌無時 參星湯 乾地龍幾五 虎睛對人參 砂錢一 露蜂房格石緑兩 參與南星地 右為末粥九梧桐子大每二三十九白湯下 石為末每服一 治虚而廟久不愈者 錢看大小薑棗湯下日二次 桂心 赤水元珠 天竺黄 遠志肉 醋

